

Edição de Março de 2014, vol. 102 (3), Supl. 1, pág. 1-61

As “Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento ST (II Edição, 2007) – Atualização 2013”, publicadas como suplemento número três da edição de março de 2014 dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia [Arq Bras Cardiol. 2014;102(3Supl.1):1-61], sofreram as seguintes correções:

Na página 46, no item “Abordagem lipídica – Resumo das Recomendações e Evidências”, subitem “Recomendações classe 1”, considerar o texto a seguir como segundo tópico:

Para pacientes com SIMISST e LDL-C \geq 100 mg/dL, as estatinas devem ser utilizadas na ausência de contraindicações, visando alcançar uma meta de LDL-C $<$ 70 mg/dL (nível de evidência: A). Caso o paciente suporte, a estatina deve ser mantida indefinidamente.

Na página 46, item “Abordagem lipídica – Resumo das Recomendações e Evidências”, subitem “Recomendações classe 1”, inserção de terceiro tópico:

Caso o paciente já venha em uso de estatina, a mesma não deve ser suspensa independentemente do nível do LDL-C (nível de evidência: B).

Na página 46, no item “Abordagem lipídica – Resumo das Recomendações e Evidências”, o subitem “Recomendações classe 2” foi retirado.