



[RETRATAÇÃO]: O PAPEL DOS NÍVEIS SÉRICOS DE CK-18, MMP-9 E TIPM-1 NA PREDIÇÃO DA RESSECÇÃO R0 EM PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO

A equipe da revista Arquivos Brasileiro de Cirurgia Digestiva comunica publicação formal Retratação para extração do artigo:

Peduk S, Dincer M, Tatar C, Ozer B, Kocakusak A, Citlak G Akinci M. O PAPEL DOS NÍVEIS SÉRICOS DE CK-18, MMP-9 E TIPM-1 NA PREDIÇÃO DA RESSECÇÃO R0 EM PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO. ABCD, arq. bras. cir. dig. 2018; 31(4): e1401. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-672020180001e1401>.

Desde que foi comprovada a publicação duplicada do artigo que foi disponibilizado em outro periódico.

Peduk S, Tatar C, Dincer M, Ozer B, Kocakusak A, Citlak G, Akinci M, Tuzun IS. The Role of Serum CK18, TIMP1, and MMP-9 Levels in Predicting R0 Resection in Patients with Gastric Cancer. Dis Markers. 2018 Feb 5;2018:5604702. doi: 10.1155/2018/5604702. PMID: 29651326; PMCID: PMC5832075.

Cordialmente,

Prof. Dr. Osvaldo Malafaia
Editor-Chefe