

SÔBRE O ÁCARO CAUSADOR DO BRONZEADO DO ALGODOEIRO MOCÓ (*). A. S. COSTA. Na ocasião em que foi descrito o bronzeado do algodoeiro Mocó (1) na região do Seridó, R. G. do Norte, referiu-se que o ácaro encontrado associado a essa anomalia tinha sido identificado por H. H. Keiffer, Sacramento, California, como sendo representante de um gênero ainda não descrito. A conselho daquele especialista foi o ácaro em aprêço temporariamente designado por *Anthocoptes* sp. (2).

Mais recentemente foi publicado um trabalho de Keiffer (3), no qual esse taxonomista descreve o ácaro causador do bronzeado sob a denominação de *Heterotergum gossypii* Keiffer, sendo essa espécie o genótipo dêsse novo gênero. Tratando-se de publicação pouco comum em nossas bibliotecas, julgou-se de interêsse referir nesta nota o nome dado ao ácaro do bronzeado. SEÇÃO DE VIROLOGIA, INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

NAME OF THE MITE THAT CAUSES BRONZING OF THE MOCÓ COTTON

SUMMARY

Reference is made to a paper by Keiffer in which the scientific name of the mite responsible for the bronzing of Mocó cotton is given. This mite received the name *Heterotergum gossypii* Keiffer and is the genotype of the new genus.

(*) Recebida para publicação em 30 de maio de 1956.

(1) COSTA, A. S., NASCIMENTO, FERNANDO MELLO DO & BORGES, HUMBERTO ESCOREL. Observações sôbre o bronzeado o algodoeiro Mocó. *Bragantia* 14:[27]-34. 1954.

(2) KEIFFER, H. H. Informações sôbre ácaro remetido para identificação. Sacramento, Calif., 1954. (Comunicação escrita)

(3) KEIFFER, H. H. Eriophyid studies XXIII. Calif. quart. Bull. 44:126-130. 1955.