

ERRATA

In the article RODRIGUES, J.I. da S.; MIRANDA, F.D. de; FERREIRA, A.; BORGES, L.L.; FERREIRA, M.F. da S.; GOOD-GOD, P.I.V.; PIOVESAN, N.D.; BARROS, E.G. de; CRUZ, C.D.; MOREIRA, M.A. **Mapeamento de QTL para conteúdos de proteína e óleo em soja**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.45, n.5, p.472-480, may 2010, replace the content of Table 4 by the following:

Tabela 4. Locos de caracteres quantitativos (QTL) detectados para os conteúdos de proteína e óleo nas progênies $F_{2:3}$, derivadas de CS3032PTA276 e UFVS2012, pelos métodos de mapeamento por intervalo simples e composto.

Grupo de ligação ⁽¹⁾	Intervalo/região	LR	R ² (%) ⁽²⁾	a ⁽³⁾	d ⁽⁴⁾
A1	Satt300-Satt155	19,51**	12,71	0,434	1,670
D1a	Satt408-Satt147	9,51*	6,24	0,477	0,606
G	Satt533	12,58*	13,89	0,234	-1,815
I	Satt239	25,94**	18,94	0,862	-0,814
A1	Satt200-Satt225	164,48**	17,26	0,056	0,963
I	Satt239-Satt367	39,22**	25,93	-0,562	-0,034
O	Satt500-Satt259	11,36*	18,51	-0,215	-1,442

⁽¹⁾Conforme Song et al. (2004). ⁽²⁾Proporção da variação fenotípica explicada pelo QTL. ⁽³⁾Efeito aditivo estimado para o QTL. ⁽⁴⁾Efeito da dominância estimado para o QTL. * e **, valores de razão de verossimilhança (LR) excederam os valores críticos de corte, a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente. Os valores de LR críticos foram determinados pela realização de mil permutações.