

ERRATA

No artigo RODRIGUES, J.I. da S.; MIRANDA, F.D. de; FERREIRA, A.; BORGES, L.L.; FERREIRA, M.F. da S.; GOOD-GOD, P.I.V.; PIOVESAN, N.D.; BARROS, E.G. de; CRUZ, C.D.; MOREIRA, M.A. **Mapeamento de QTL para conteúdos de proteína e óleo em soja**. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.45, n.5, p.472-480, maio 2010, substituir o conteúdo da Tabela 4 pelo seguinte:

Tabela 4. Locos de caracteres quantitativos (QTL) detectados para os conteúdos de proteína e óleo nas progênies $F_{2:3}$, derivadas de CS3032PTA276 e UFVS2012, pelos métodos de mapeamento por intervalo simples e composto.

| Grupo de ligação ⁽¹⁾ | Intervalo/região | LR | R ² (%) ⁽²⁾ | a ⁽³⁾ | d ⁽⁴⁾ |
|---------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| A1 | Satt300-Satt155 | 19,51** | 12,71 | 0,434 | 1,670 |
| D1a | Satt408-Satt147 | 9,51* | 6,24 | 0,477 | 0,606 |
| G | Satt533 | 12,58* | 13,89 | 0,234 | -1,815 |
| I | Satt239 | 25,94** | 18,94 | 0,862 | -0,814 |
| A1 | Satt200-Satt225 | 164,48** | 17,26 | 0,056 | 0,963 |
| I | Satt239-Satt367 | 39,22** | 25,93 | -0,562 | -0,034 |
| O | Satt500-Satt259 | 11,36* | 18,51 | -0,215 | -1,442 |

⁽¹⁾Conforme Song et al. (2004). ⁽²⁾Proporção da variação fenotípica explicada pelo QTL. ⁽³⁾Efeito aditivo estimado para o QTL. ⁽⁴⁾Efeito da dominância estimado para o QTL. * e **, valores de razão de verossimilhança (LR) excederam os valores críticos de corte, a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente. Os valores de LR críticos foram determinados pela realização de mil permutações.