



# REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA

Publicación Oficial de la Sociedade Brasileira de Anestesiologia  
[www.sba.com.br](http://www.sba.com.br)



## ERRATAS

### Errata de “La adición de lidocaína a la levobupivacaína reduce la duración del bloqueo intratecal: estudio clínico aleatorizado”



### Erratum of “Addition of lidocaine to levobupivacaine reduces intrathecal block duration: randomized controlled trial”

Dilek Yazicioglu\*, Taylan Akkaya, Ercan Sonmez y Haluk Gumus

*Hospital de Enseñanza e Investigación Ankara Diskapi Yildirim Beyazit, Ankara, Turquía*

En el artículo “La adición de lidocaína a la levobupivacaína reduce la duración del bloqueo intratecal: estudio clínico aleatorizado” (Rev Bras Anesthesiol. 2014;64(3):159-163), en la página 163, primera columna, sexto párrafo, que dice:

“Por lo que sabemos, este es el primer estudio en el que se usa la combinación de levobupivacaína al 5% y lidocaína al 1% por vía intratecal.”

Léase:

“Por lo que sabemos, este es el primer estudio en el que se usa la combinación de levobupivacaína al 0.5% y lidocaína al 2% por vía intratecal.”

Véase contenido relacionado en DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bjanes.2013.06.005>

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [dilek.yazicioglu@hotmail.com](mailto:dilek.yazicioglu@hotmail.com) (D. Yazicioglu).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bjanes.2014.09.001>

2255-4963/© 2014 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Todos los derechos reservados.