

ERRATAS

No artigo **“Sepse Brasil: Estudo Epidemiológico da Sepse em Unidades de Terapia Intensiva Brasileiras”** publicado na RBTI, 2006;18:9-17, houve uma inversão dos nomes dos autores na capa e no sumário.

Abaixo os nomes corretos dos autores.

João Andrade L. Sales Júnior, Cid Marcos David, Rodrigo Hatum, Paulo César S. P. Souza, André Japiassú, Cleovaldo T. S. Pinheiro, Gilberto Friedman, Odin Barbosa da Silva, Mariza D’Agostino Dias, Edwin Koterba, Fernando Suparregui Dias, Cláudio Piras, Grupo de Estudo de Sepse do Fundo AMIB.

No artigo: Gravidade dos Pacientes Admitidos à Unidade de Terapia Intensiva de Hospital Universitário Brasileiro, publicado na RBTI;18:1:18-21, houve a inversão dos nomes dos autores, em relação à titulação.

A seqüência correta é:

Carlos Augusto Ramos Feijó¹, Francisco Olon Leite Júnior¹, Ana Cecília Santos Martins²,

Alberto Hil Furtado Júnior², Luiz Lacerda Souza Cruz³, Francisco Albano de Meneses⁴

1. Médico Residente em Medicina Intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC)

2. Médico Assistente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HUWC – UFC.

3. Psicólogo da UTI do HUWC – UFC

4. Médico Chefe da UTI do HUWC; Coordenador da Residência Médica em Medicina Intensiva; Especialista em Medicina Intensiva – AMIB; Mestre em Farmacologia – UFC.

No artigo **“Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica em Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica”**, de Carrilho CMDM, Grion CMC, Carvalho LM et al - publicado na RBTI; 2006;18:1:38-44, por favor observem as seguintes correções para as tabelas 3 e 4, na página 41.

Os valores de p na última coluna estão trocados com os valores do intervalo de confiança na terceira coluna, para as duas tabelas.

As tabelas totalmente corrigidas seguem abaixo.

Tabela 3 – Análise de Regressão Logística com os Fatores de Exposição

Parâmetros	O.R.	Intervalo de confiança 95%	Valor de p
Idade	1,006	0,988 - 1,024	0,5007
APACHE	0,999	0,944 - 1,056	0,9593
TISS na admissão	1,061	1,007 - 1,119	0,0274
Sem doença crônica	0,579	0,301 - 1,114	0,1017
Sem fator de risco	0,880	0,318 - 2,433	0,8047
Etilismo	2,216	0,465 - 10,556	0,3176
IRA	1,339	0,522 - 3,431	0,5432
Uso prévio de antibiótico	0,320	0,121 - 0,847	0,0218
Obesidade	1,760	0,407 - 7,605	0,4493
Diabete	1,169	0,471 - 2,902	0,7365
Tabagismo	0,466	0,113 - 1,916	0,2899
Coma	1,122	0,525 - 2,400	0,7667
Nutrição enteral	5,399	3,138 - 9,291	<0,0001

Excluídos três registros na análise por ausência de pelo menos uma informação Teste de Hosmer e Lemeshow: $\chi^2 = 8,439$, 8g,l, valor de p = 0,3918.

Tabela 4 – Análise de Regressão Logística com as Variáveis Seleccionadas pelo Método *Stepwise*.

Parâmetros	O.R.	Intervalo de Confiança 95%	Valor de p
TISS na admissão	1,050	1,003 - 1,099	0,0355
Uso prévio de antibióticos	0,399	0,177 - 0,902	0,0272
Nutrição enteral	5,609	3,351 - 9,388	< 0,0001

Excluídos três registros na análise por ausência de pelo menos uma informação . Teste de Hosmer e Lemeshow: $\chi^2 = 7,4744$; 8 g,l, valor de p = 0,4864

Nossas desculpas aos leitores.

Dra. Cláudia Maria Dantas de Maio Carrilho