

## ERRATA:

Artigo publicado no volume 11 número 1 (DOI 10.1590 / S1516-1846200900100015),  
cujo resumo correto segue abaixo:

# SINTOMA VOCAL E SUA PROVÁVEL CAUSA: LEVANTAMENTO DE DADOS EM UMA POPULAÇÃO

*Vocal symptom and its probable cause: data collecting in a population*

Léslie Piccolotto Ferreira <sup>(1)</sup>, Janine Galvão dos Santos <sup>(2)</sup>, Maria Fabiana Bonfim de Lima <sup>(3)</sup>

## RESUMO

**Objetivo:** analisar a ocorrência de sintomas vocais e a relação entre a presença deles e sua provável causa na opinião de uma amostra populacional e analisar as correlações possíveis entre sintomas e causas citados. **Métodos:** participaram da pesquisa 190 frequentadores (18 a 45 anos) de um *Shopping Center* de São Paulo. Utilizou-se um questionário contendo seis perguntas fechadas do tipo sim/não referentes a aspectos de saúde (incluindo tabagismo), percepção e provável causa de sintomas vocais. A análise dos dados foi realizada pelo teste de Qui-Quadrado. **Resultados:** os quatro sintomas mais referidos foram: rouquidão (34,2%), ardor na garganta (24,7%), garganta seca (21,6%) e tosse seca (21,6%); e as causas mais citadas, afecções respiratórias altas (46,4%), *stress* (14,2%) e uso intenso da voz (11,1%). Foi possível constatar que na opinião dos participantes, a rouquidão está associada ao uso intenso da voz ( $p < 0,001$ ) e às afecções respiratórias altas ( $p > 0,001$ ); a fadiga vocal, ao *stress* ( $p < 0,001$ ); o ardor na garganta, às afecções respiratórias altas ( $p < 0,001$ ); e o pigarro, ao tabagismo ( $p = 0,021$ ) e ao uso de drogas ( $p = 0,002$ ). **Conclusão:** os dados indicam, portanto, que a população estudada percebe que tanto os fatores externos (*stress*), como os hábitos (tabagismo e uso de drogas) interferem na produção vocal, assim como os relacionados à saúde e a voz (afecções respiratórias altas e uso intenso da voz).

**DESCRITORES:** Distúrbios da Voz; População; Epidemiologia; Voz